

Medicin håndtering

Akut behandling - lommekort

Bilag 1. Tjekliste: Akut behandling med adrenalin¹

Alvorlig allergisk reaktion viser sig bl.a. ved kløe, rødme og varme i huden, ødemer og udslæt.

Anafylaktisk shock viser sig bl.a. ved hjertebanken, bleghed, opkastninger, vejrtrækningsbesvær.

Kan fremkaldes bl.a. af injektioner med medicin.

1. Tilkald hjælp. Hjælpen ringer 112
2. Sikr frie luftveje
3. Læg borgeren fladt med løftede ben (eller siddende med benene oppe, hvis borgerens vejrtrækning er besværet)
4. Injicer adrenalin 1 mg/ml dybt i.m. Tjek, at kanylen ikke ligger i en blodåre
 Voksne og børn \geq 25 kg: 0,3 ml
 Børn < 25 kg: 0,15 ml
5. Tjek vejrtrækning, puls og blodtryk
6. Gentag behandling med adrenalin efter 5-10 minutter, hvis effekten ikke er tilstrækkelig
7. Giv eventuelt antihistamin p.o.
8. Dokumenter
 - a. dato, navn udfører
 - b. givne behandling
 - c. opdater Cave
 - d. informer borgerens læge.

Referencer

- Anafylaksi i almen praksis. Rationel farmakoterapi, 1, Maj 2021. Sundhedsstyrelsen
- pro.medicin.dk Adrenalin (oplysninger indhentet 09.03.2021)

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Instruksen er udarbejdet af: | Ansvarlig for instruksen: | Godkendt af: |
| Kirsten Pultz / Hanne Skjernaa Farmaceut / Praksiskonsulent | Kirsten Pultz Farmaceut | Camilla Köcher Strøyberg, distriktsleder Camilla Woller-Nielsen, distriktsleder Katarzyna Darling, distriktsleder, Camilla Frederiksen, palliationspsygeplejerske. LU |
| Revisionsdato: 22.9.2021 | Næste revision: 22.9.2022 | |