

Kalium

Risikosituationslægemidler¹

Medicinhåndtering

Instruksen beskriver sikker håndtering af lægemidler med kalium, herunder

- hvilke medarbejdergrupper, der har kompetence til at håndtere lægemidlerne.
- sikker håndtering af lægemidlerne.
- vigtige OBS-punkter, og hvornår lægen skal kontaktes.

Målgruppe

Sygeplejersker, farmakonomer, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Formål

- At forebygge forudsigelige fejl.
- At sikre enkle, forståelige og sikre arbejdsgange.
- At sikre god viden om behandling med risikosituationslægemidler og risikosituationer.

Kalium¹

- **Kompetence**
 - Dispensering: Sygeplejersker, farmakonomer og social- og sundhedsassistenter.
 - Administration af perorale lægemidler: Sygeplejersker, farmakonomer og social- og sundhedsassistenter.
 - Administration af dispenserede perorale lægemidler: Sygeplejersker, farmakonomer, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.
- **Sikker håndtering**
 - Vær opmærksom ved ændringer i medicinering med lægemidler med kalium, om borgeren får symptomer på for højt eller for lavt kalium eller natrium.
 - Du kan dispensere Kalium oral opløsning til 1 døgn. Hæld præparatet op i små plastikbægre mærket med borgerens navn og CPR-nummer, lægemidlets navn og styrke, ugedag og klokkeslæt for administrationen. Bægrene skal opbevares i køleskab med låg på.
- **OBS**
 - For højt kalium: træt, muskelsvaghed, oppustet mave, diarré.
 - For lavt kalium: træt, muskelsvaghed, kramper i underbenene, forstoppelse.
 - For højt natrium: dehydrering, koncentreret urin, væggtab/vægtøgning.
 - For lavt natrium: forvirret, sløv, kramper (svære tilfælde), ingen appetit, kvalme, hovedpine, koncentrationsbesvær.
 - Borgere, der får kalium i.v.: samtidig oral behandling med kalium, forveksling med oral opløsning, korrekt fortynding samt indløbstid.
 - Depottabletters matrix (plastikskelet) kan genfindes i afføringen.
 - Borgeren skal ikke have kalium både som fast og flydende.
- **Kontakt lægen**
 - Hvis du har mistanke om, at borgeren har for højt eller for lavt kalium eller natrium.

Dokumentation

- Dokumenter uregelmæssigheder i *".observation"* og relater til den relevante tilstand.
- Kvitter for at have givet medicin. Se instruksen Administration af medicin. Medicinhåndtering.

¹ Fx Kaliumklorid Oral opløsning, Kaleorid, Centyl med Kaliumklorid, Bendroza

- Indberet eventuelle utilsigtede hændelser.

Kvalitetsopfølgning

Systematisk opfølgning

2 gange om året gennemgår distriktsleder og patientsikkerhedskoordinator sammen med farmaceut/farmakonom rapporter af utilsigtede hændelser, som omfatter risikosituationslægemidler.

Opfølgning "ad hoc"

Hvornår: Ved klager og utilsigtede hændelser

Hvem: Vil variere fra gang til gang.

Referencer og nyttige links

- Risikosituationslægemidler. En guide til sikker medicinhandling. 1. udgave, november 2021. Styrelsen for Patientsikkerhed
<https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/~media/1E6429B8918943BB8CF2E3AC4BB84B24>
- Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside
<https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/>
- Pro.medicin.dk
- Vejledning om udfærdigelse af instrukser. VEJ nr 9001 af 20/11/2000.

i

Instruksen er udarbejdet af: Kirsten Pultz Farmaceut	Ansvarlig for instruksen: Kirsten Pultz Farmaceut	Godkendt af: KUF HHP
Revisionsdato: 30. oktober 2022	Næste revision: Oktober 2024	