

# Overgang til dosisdispenseret medicin

## Medicinhandling

### Bilag 1. Tjekliste til overgang til dosisdispenseret medicin

1. Udvælg borgere, som kan være i målgruppen<sup>1</sup>.
2. Tjek om der er planer om ændringer i medicinen og om borgeren har fået den samme medicin i den samme dosis i 1-3 måneder.
3. Tjek i medicinpriser.dk, at alle borgerens faste, doserede lægemidler kan dosisdispenseres.
4. Når du skal dispensere hos borgere i målgruppen, skal du medbringe "Til dig, der skal overgå til dosisdispenseret medicin" fra kommunen og brochuren "Dosispakket medicin" fra apoteket.
5. Informer borgeren om, at han/hun er i målgruppen for at få dosisdispenseret sin medicin. Brug fx videoen Dosispakket medicin fra Apotekets hjemmeside <https://www.apoteket.dk/dosispak>.
6. Vurder ud fra borgerens medicinbeholdning, hvornår dosisdispensering skal starte. Rullestart er mandag i ulige uger fra Gilleleje Apotek og tirsdag i ulige uger fra Helsingør Apotek.
7. Skriv med borgerens samtykke MedCom til lægen, at du vurderer, at borgeren er i målgruppen for dosispakning og spørg, om lægen er enig. Brug skabelonen i Nexus "Opstart dosisdispensering".
8. Dokumentér.
9. Lægen svarer indenfor 14 dage.
10. Hvis lægen er enig, fortsætter du med at dispensere frem til dosisdispensering starter. Lægen opretter dosisrecepter.
11. Giv besked til apoteket. Brug samme blanket som til lægen.
12. Opdater det faglige notat og handlingsanvisningen.
13. Ændr "Medicinansvarlig" fra "Sundhedsfaglig medarbejder – skal dispenseres i æske" til "Dosisdispenseret"
14. Borgeren er selvadministrerende: Besøg hos borgeren 1-3 gange (brug indsatsen "Oplæring i brug af dosisruller") til borgeren selv kan håndtere dosisposen.
15. Dokumenter. Afslut tilknytning til FMK. Luk medicinlisten. Afslut indsatserne "Dispensering" og "Oplæring i brug af dosisruller".
16. Skriv MedCom til lægen, at borgeren nu er selvhjulpnen med medicin.
17. Helhedsplejen administrerer borgerens medicin: Juster handlingsanvisningen. Indsatsen er "Medicinalgivning".
18. Social-og sundhedshjælper, der administrerer, kontrollerer den enkelte dosispose som vanligt.

---

<sup>1</sup> Ikke i målgruppen: Hyppige ændringer, hyppige indlæggelser, medicin ordineres flere steder i sundhedsvæsenet, ikke al fast medicin kan dosisdispenseres (fx Pradaxa),