

Medicin håndtering

Rekvirering og opbevaring af adrenalin til brug ved injektioner

Bilag 1. Tjekliste: Akut behandling med adrenalinⁱ

Alvorlig allergisk reaktion viser sig blandt andet ved kløe, rødme og varme i huden, ødemer og udslæt.

Anafylaktisk shock viser sig blandt andet ved hjertebanken, bleghed, opkastninger, vejrtrækningsbesvær.

Kan fremkaldes blandt andet af injektioner med medicin.

1. Tilkald hjælp. Hjælpen ringer 112.
2. Sikr frie luftveje.
3. Læg borgeren fladt med løftede ben (eller siddende med benene oppe, hvis borgerens vejrtrækning er besværet).
4. Injicer adrenalin 1 mg/ml dybt i.m. Tjek, at kanylen ikke ligger i en blodåre, ved at trække stemplet tilbage
Voksne og børn > 25 kg: 0,3 ml
Børn < 25 kg: 0,15 ml
5. Tjek vejrtrækning, puls og blodtryk.
6. Gentag behandling med adrenalin efter 5-10 minutter, hvis effekten ikke er tilstrækkelig.
7. Giv eventuelt antihistamin peroralt.
8. Dokumenter
 - a. dato, navn udfører
 - b. givne behandling
 - c. opdater Cave
 - d. informer borgerens læge.

Teksten, som er fremhævet med gult, findes på et lamineret kort i det autoriserede personales "adrenalin-kit".

Referencer

- Anafylaksi i almen praksis. Rationel Farmakoterapi, 1. Maj 2021. Sundhedsstyrelsen
- pro.medicin.dk Anafylaktisk shock (revideret 5. maj 2023)

| | | |
|--|--|--|
| Instruksen er udarbejdet af: Kirsten Pultz Farmaceut Hanne Skjernaa Praksiskonsulent | Ansvarlig for instruksen: Gitte Widmer Sygeplejefaglig leder | Godkendt af: Faglige koordinatore i HHP |
| Revisionsdato: 30. oktober 2023 | Næste revision: November 2025 | |